

Số: /SYT-NVY

Nghệ An, ngày tháng 6 năm 2026

V/v đẩy mạnh hoạt động truyền thông
và các biện pháp phòng bệnh dại

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các Trung tâm y tế trực thuộc Sở,

tỉnh Nghệ An.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 01 trường hợp mắc và tử vong do bệnh dại (tại xã Bạch Hà). Trường hợp này chưa được tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng bệnh dại sau khi phơi nhiễm.

Để chủ động phòng bệnh dại trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

1. Các Trung tâm Y tế trực thuộc Sở

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho người dân tại cộng đồng về bệnh dại, các biện pháp phòng tránh, xử lý khi bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng dại. Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu nguy cơ, tác hại của việc điều trị bệnh dại bằng thuốc nam.

- Phối hợp ngành Chăn nuôi thú y điều tra dịch tễ bệnh dại trên đàn vật nuôi tại các địa bàn có liên quan đến bệnh nhân.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh dại trên người, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi dại, báo cáo số người tiêm vắc xin phòng dại theo quy định.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, phát hiện bệnh dại trên người, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi dại, báo cáo số người tiêm vắc xin phòng dại ở các tuyến.

- Phối hợp các Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở về: Khám và tư vấn, xử lý vết thương khi bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, giám sát và quản lý người bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, kỹ thuật tiêm phòng....

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh dại và cách phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.

- Tham mưu đảm bảo cung ứng đầy đủ số lượng vắc xin, huyết thanh để tiêm phòng kịp thời cho người bị chó, mèo mắc bệnh, nghi mắc bệnh dại cắn.

3. Đề nghị UBND các xã, phường

- Chỉ đạo Trạm Y tế và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh dại bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương.

- Tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tiêm phòng dại cho chó, mèo; không thả rông chó, mèo; chấp hành việc quản lý vật nuôi theo quy định.

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường phát sóng các thông điệp truyền thông về bệnh dại, đặc biệt tại các địa bàn có nguy cơ cao. *(Bài truyền thông đính kèm)*

Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (p/h);
- GD, các PGD Sở (b/c);
- Lưu VT, NVY.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thương

BÀI TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐẠI

(Ban hành kèm theo Công văn số /SYT-NVY ngày /6/2026 của Sở Y tế)

Bệnh dại vẫn đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng tại Nghệ An. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong 100% khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và tiêm phòng kịp thời.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại xảy ra do người dân còn chủ quan sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào; không đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời mà tin vào các phương pháp điều trị dân gian, thuốc nam hoặc các biện pháp chưa được cơ quan y tế khuyến cáo. Đây là những quan niệm sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống bệnh dại, ý thức và sự chủ động của mỗi người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Để chủ động phòng, chống bệnh dại, ngành Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Quản lý tốt nguồn lây bệnh từ chó, mèo theo khuyến cáo của ngành Thú Y

- Tiêm vắc xin phòng dại đầy đủ và định kỳ hằng năm cho chó, mèo theo quy định.

- Quản lý vật nuôi, không thả rông chó, mèo; thực hiện đeo rọ mõm hoặc xích giữ khi đưa chó ra nơi công cộng.

- Theo dõi, khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y khi phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại hoặc chết bất thường.

2. Xử trí đúng và kịp thời khi bị chó, mèo cắn hoặc cào

- Sơ cứu vết thương

Ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da bị tổn thương, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường trong ít nhất 15 phút; sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch sát khuẩn phù hợp.

Không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, thuốc bột hoặc làm tổn thương vết thương nặng thêm.

- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và chỉ định tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại khi cần thiết.

3. Chủ động bảo vệ những người có nguy cơ cao

Những người thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo hoặc động vật có nguy cơ mang vi rút dại như nhân viên thú y, người chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển,

giết mổ chó, mèo, người tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật... nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng đại trước phơi nhiễm.

4. Tuyệt đối KHÔNG được sử dụng biện pháp chữa bệnh đại dân gian, thuốc nam,..

- Việc sử dụng các biện pháp dân gian, thuốc nam để thử và chữa bệnh đại làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

- Người dân tuyệt đối không dùng thuốc nam, các biện pháp không được Bộ Y tế công nhận để thử, chữa bệnh đại.

- Khi có người thân, người quen sử dụng thuốc nam để chữa bệnh đại sau khi bị chó mèo cắn cần quan tâm, khuyên nhủ đến các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng bệnh đại kịp thời.

- Tại địa phương, khi có người tổ chức bán thuốc nam hay dùng các biện pháp không được Bộ Y tế công nhận để thử, chữa bệnh đại cho người khác cần phải báo lên các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng bệnh, quản lý tốt vật nuôi và chủ động tiêm phòng khi có nguy cơ phơi nhiễm. Đừng để sự chủ quan đánh đổi bằng tính mạng của chính mình và người thân. Bệnh đại không có thuốc điều trị khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí đúng và tiêm phòng kịp thời.