

Số: /TB-UBND

Nam Đàn, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc theo dõi phòng trừ sâu đục thân, nhện gié, bệnh lem lép hạt hại lúa vụ Hè Thu 2026

Kính gửi: Ban chỉ huy các xóm và bà con nông dân trên địa bàn xã.

Hiện nay lúa Hè thu đang ở thời kỳ làm đòng đến trổ. Sâu đục thân, nhện gié hại lúa đang phát sinh gây hại và có xu hướng gia tăng trên một số diện tích lúa vụ Hè thu. Dự báo trong thời gian tới lúa vụ Hè thu vào giai đoạn ôm đòng đến trổ đại trà là giai đoạn rất thích hợp cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa đặc biệt là các đối tượng như: nhện gié, sâu đục thân, bệnh lem lép hạt,...

Để chủ động phát hiện, phòng trừ kịp thời, hiệu quả hạn chế tối đa thiệt hại do nhện gié, sâu đục thân và bệnh lem lép hạt gây ra đối với sản xuất lúa vụ Hè thu. UBND xã đề nghị Ban chỉ huy các xóm và bà con nông dân tập trung thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đối với sâu đục thân: Giám sát chặt chẽ đồng ruộng, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phun trừ sớm trên những diện tích có mật độ ổ trứng cao (0,3 ổ trứng/m² trở lên lúa ở thời kỳ làm đòng trở đi) bằng các loại thuốc các loại thuốc có hoạt chất như: Chlorantraniliprole (Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,...), Nereistoxin (Neretox 95 WP,...),... phun theo liều lượng khuyến cáo (nếu mật độ ổ trứng cao > 0,5 ổ/m² cần phun 2 lần cách nhau 5 ngày).

2. Đối với nhện gié: Chú ý kiểm tra bẹ lá, gân lá; khi phát hiện bẹ gân lá có màu nâu, tỷ lệ đánh bị hại 5 - 7% trở lên, lúa ở giai đoạn ôm đòng đến trổ cần tổ chức phòng trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Hexythiazox (Nissorun 5EC,...); Fenitrothion (Danitol 50EC,...),.....theo liều lượng khuyến cáo, trường hợp tỷ lệ nhện hại cao cần phải phun lại lần 2 sau 5 - 7 ngày. Khi phun cần chú ý tăng lượng nước thuốc để phun ướt đều phần thân và bẹ lá lúa.

3. Đối với bệnh lem lép hạt: Trong thời gian lúa bắt đầu trổ đến trổ hoàn toàn nếu có nguy cơ gặp điều kiện thời tiết mưa kéo dài, ẩm độ cao,... nhất thiết phải tổ chức phun phòng bệnh ngay bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Difenconazole + Propiconazole (Tilt super 300ND,...); Propiconazole (Tiptop Gold 400 EC, Tilt 250 EC,...);.....Thời điểm phun thuốc: Phun khi lúa bắt đầu trổ và phun lại lần 2 khi lúa đã trổ hoàn toàn nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển.

- **Ban chỉ huy các xóm:** Tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xóm để bà con nắm bắt kịp thời.

- **Bà con nông dân:** Thường xuyên thăm đồng, theo dõi sát diễn biến sâu bệnh, chủ động phòng trừ ngay khi sâu bệnh đạt ngưỡng theo khuyến cáo;

không chủ quan, không phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.

UBND xã giao bộ phận chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và dịch hại để có chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ban chỉ huy các xóm và bà con nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực UBND xã (b/c);
- Ban chỉ đạo SX Hè thu;
- Trung tâm Cung ứng DVC;
- BCH 11 xóm;
- Lưu: VT, PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương