

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: /TT&BVTV-BVTV Nghệ An, ngày tháng năm 2026
V/v theo dõi, chỉ đạo phòng trừ châu chấu tre
lưng vàng hại mét năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã;
- Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ, Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương.

Nghệ An hiện có trên 4.306 ha mét được trồng tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Con Cuông, Châu Khê, Nhân Hòa, Tam Quang, Tam Thái,... Châu chấu tre lưng vàng là sinh vật gây hại chính, hàng năm thường phát sinh gây hại nặng trên các rừng tre, mét trên địa bàn tỉnh. Ngoài tre, mét châu chấu tre trưởng thành còn di chuyển gây hại trên nhiều cây trồng nông nghiệp khác. Năm 2025, châu chấu tre lưng vàng đã phát sinh mật độ cao, gây hại trên 150 ha mét tại xã Nghĩa Đồng sau đó di chuyển sang gây hại trên một số diện tích mía, ngô, cỏ voi,...

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực Bắc trung bộ, nhiệt độ trong tháng 4/2026 và những tháng tiếp theo nắng nóng có khả năng gia tăng, kết hợp với các những đợt mưa chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho châu chấu tre lưng vàng phát sinh phát triển. Theo kết quả điều tra, hiện nay châu chấu tre lưng vàng đã bắt đầu phát sinh dưới dạng các ổ châu chấu non mới nở tại xóm Khe Thần xã Nghĩa Đồng. Dự báo các ổ châu chấu non sẽ tiếp tục phát sinh trong những ngày tới và có khả năng sẽ xuất hiện với mật độ cao, trên diện rộng trong tháng 4 - 5 năm 2026.

Để chủ động phát hiện, phòng trừ giảm thiểu thiệt hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra trên các vùng trồng mét. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, các Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã, ban quản lý rừng phòng hộ chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các xóm (thôn, bản) có trồng mét, các đơn vị chuyên môn phối hợp các chủ rừng tăng cường điều tra, giám sát để phát hiện sớm sự phát sinh gây hại của châu chấu tre lưng vàng trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực hàng năm thường bị châu chấu gây hại nhiều để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ hiệu quả ngay khi châu chấu mới phát sinh trên diện hẹp (dạng các ổ mới nở còn co cụm).

- Hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời, cụ thể cho các chủ rừng tổ chức phòng trừ gồm:

+ Biện pháp thủ công: Huy động nhân lực sử dụng vợt để bắt đối với những vùng châu chấu mới phát sinh và đang co cụm trên diện hẹp.

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng các loại thuốc hóa học có hoạt chất: Permethrin, Cypermethrin, Alpha cypermethrin, Fenitrothion, Imidacloprid, Emamectin benzoate,... để bao vây phun trừ sớm (khi châu chấu còn co cụm và chưa bay được).

Lưu ý: Đối với khu vực gần nguồn nước, ao hồ nuôi trồng thủy sản chỉ áp dụng biện pháp thủ công (vợt bắt) để hạn chế thiệt hại và nguy cơ ô nhiễm thuốc BVTV.

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình diễn biến gây hại của châu chấu tre lưng vàng, kết quả công tác chỉ đạo phòng trừ báo cáo về Chi cục Trồng trọt và BVTV thực vật thông qua chế độ báo cáo định kỳ để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả khi cần thiết.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã chỉ đạo các Trung tâm cung ứng dịch vụ công, các chủ rừng và đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm TT&BVTV vùng 4 (để báo cáo)
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (để báo cáo);
- Lưu VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Đức