

UBND XÃ QUỖ HỢP
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DVC

Số: **30** /TTCUDVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Quỳ Hợp, ngày **31** tháng 3 năm 2026

V/v theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại chính trên
lúa vụ Xuân năm 2026 giai đoạn trổ đến chắc xanh

Kính gửi: - UBND xã Quỳ Hợp;
- Xóm trưởng 54 xóm, bản.

Thực hiện Công văn số 120/TT&BVTV-BVTV ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An V/v theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại chính trên lúa vụ Xuân năm 2026 giai đoạn trổ đến chắc xanh

Hiện nay lúa vụ Xuân 2026 đang thời kỳ đứng cái đến làm đòng một số sâu bệnh hại như : bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn lá, khô vằn, rầy nâu..... đã phát sinh và đang có xu hướng lây lan gây hại trên diện rộng.

Dự báo thời gian tới là thời điểm chuyển mùa nên thời tiết sẽ diễn biến khó lường, thời gian lúa trổ kéo dài do đó trong thời gian trổ đến chắc xanh có thể gặp các đợt không khí lạnh, trời âm u, có mưa, mưa rào kèm theo giông lốc, ẩm độ cao,... là những điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié, bệnh lem lép hạt, bệnh bạc lá vi khuẩn, khô vằn rầy nâu,... phát sinh gây hại nặng trên diện rộng, đặc biệt trên những vùng, những giống lúa hàng năm thường bị các loại bệnh trên gây hại nặng.

Để chủ động phòng trừ, giảm thiểu thiệt hại do sâu, bệnh gây ra đối với lúa vụ Xuân năm 2026. Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp đề nghị các xóm bản, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên thăm kiểm tra, giám sát đồng ruộng, kịp thời phát hiện dấu hiệu một số bệnh hại chính bệnh hại chính như: Đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, bạc lá vi khuẩn, nhện gié, khô vằn,...

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié và bệnh lem lép hạt: Theo dõi sát diễn biến thời tiết trong thời gian lúa bắt đầu trổ đến trổ hoàn toàn, nếu thời gian này gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển như: Có mưa, âm u, ẩm độ cao, sương mù kéo dài,... nhất thiết phải tổ chức phun phòng bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu có hoạt chất như:

+ Đối với bệnh đạo ôn cổ bông : Beam 75WP, Kabim 30WP, Filia 525SE, Bankan 600WP, Newbem 750 WP, Tricom 75 WP, Angate 75 WP, Newtec 300SC,... Katana 20SC, Kasoto 200SC,...

+ Đối với bệnh lem lép hạt : Tilt super 300ND, Still Liver 300ME, Scooter 300EC,...; Tiptop Gold 400 EC, Tilt 250 EC, Amistar top 325 SC, Anthuoc Top 480SC, Nativo 750WG, Conabin 750 WG,...

Phun thuốc bảo vệ thực vật khi lúa bắt đầu trổ (3 –5% bông) và phun lại lần 2 khi lúa đã trổ hoàn toàn nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho bệnh phát sinh phát triển. Trường hợp thời gian lúa trổ gặp điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm độ không khí thấp kéo dài thì không cần thiết phải phun phòng đối với bệnh đạo ôn cổ bông.

Lưu ý: Cần tập trung phun phòng trừ cao trên những diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn trên lá, tai lá đòng và các vùng, giống hàng năm thường bị bệnh gây hại nặng. Có thể kết hợp thuốc trừ bệnh đạo ôn và thuốc trừ bệnh lem lép hạt để phòng trừ cùng lúc hai loại bệnh trên. Đảm bảo thực hiện nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV.

+ Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh phát sinh và lây lan nhanh khi gặp mưa kèm theo giông lốc, gió mạnh. Để phòng ngừa bệnh thì việc áp dụng biện pháp canh như bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm,... là biện pháp hiệu quả nhất. Trường hợp bệnh phát sinh có thể sử dụng một trong các loại thuốc: Xantoxin 40WP, Totan 200WP, Xanthomix 20WP, Bonny 4SL, Kozuma 5WP, Ychatot 900 SP, Probencarb 250 WP,.... phun ngay khi bệnh mới xuất hiện để hạn chế sự phát sinh gây hại và sự lây lan của bệnh.

+ Đối với rầy nâu : Trong thời gian tới, điều kiện thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp, mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi để rầy tích lũy số lượng, bùng phát về mật độ trên diện rộng sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Ban cán sự xóm hướng dẫn chỉ đạo bà con nông dân bao vây phun trừ trên những diện tích có mật độ rầy đạt 750 con/m² trở lên bằng các loại thuốc đặc hiệu, có tác dụng nội hấp, lưu dẫn như: Sutin 50SC,.... Khi phun cần đảm bảo đủ lượng nước tối thiểu 24lít nước thuốc/ sào và phun ướt đều toàn bộ thân lá lúa.

Lưu ý:

- Tuyệt đối dừng ngay việc bón thúc đạm, các loại phân bón lá, không pha trộn thuốc trừ bệnh và phân bón qua lá để phun ... trên ruộng bị bệnh đang phun phòng trừ và các ruộng xung quanh.

Nhận được công văn này kính đề nghị các xóm hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt nội dung trên nhằm bảo vệ an toàn sản xuất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng kinh tế (b/c);
- Lưu: VT.

